

Vaccino	nascita	3° mese	5° mese	11° mese	13° mese	24° mese	36° mese	36° mese	5-6 anni	11-12 anni
DTP		DTaP	DTaP	DTaP					DTaP	Tdap
IPV		IPV	IPV	IPV					IPV	
Epatite B	HB*	HB	HB	HB						HB**
Hib		Hib	Hib	Hib						
MPR					*** MPR				*** MPR	
PCV		PCV								
MenC		MenC								

DTaP: vaccinazione antidifterico-tetanico-pertossica

IPV: vaccino antipoliomelitico iniettabile—inattivato

* : neonati di madri portatrici devono ricevere un'immunizzazione attiva e passiva simultanea subito dopo la nascita

** : vaccinazione antiepatite B (in 3 dosi) negli adolescenti all'età di 11 e 12 anni non vaccinati precedentemente (fino all'anno 2003)

Hib: vaccino anti-Haemophilus influenzae b

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

***: dopo la prima dose del vaccino, si consiglia una seconda dose in età prescolare oppure tra gli 11 e 12 anni

PCV: vaccino pneumococcico coniugato eptavalente

Men C: vaccino meningococcico C coniugato

Tdap: vaccino difto-tetanico-pertossio acellulare per adulto

HB: vaccino antiepatite B

Farmacia Dr. Di Muria Alberto
Via Nazionale 199 Padula Scalo (SA)
info@farmaciadimuria.it

www.farmaciadimuria.it