Diario terapeutico del paziente in terapia per eradicazione dell'Helicobacter Pylori

Terapia	**Dose per 7gg**	**Monitoraggio**	**1° gg**	**2°gg**	**3°gg**	**4°gg**	**5°gg**	**6°gg**	**7°gg**
Claritromicina	500mg ×2al dì per 7 giorni	• Controllare la funzionalità epatica (determinazione delle transaminasi) e renale specie in pazienti con funzionalità epatica ridotta, nei soggetti con insufficienza renale di grado moderato o severo e negli anziani (oltre 65 anni) • Controllare la funzionalità cardiaca: il farmaco può causare prolungamento dell'intervallo QT e aritmie cardiache • Controllare la glicemia: sono stati segnalati casi di ipoglicemia in pazienti in terapia concomitante con ipoglicemizzanti o insulina	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: ____	h: _____	h: _____
Esomeprazolo	20mg ×2al dì per 7 giorni	• Controllare periodicamente le transaminasi epatiche	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____
Amoxicillina	1g ×2al dì per 7 giorni	• Controllare periodicamente la crasi ematica • Controllare la funzionalità renale ed epatica	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____	h: _____