

Farmacia Dr. Di Muria Alberto
Via Nazionale 199
Padula Scalo (SA)
Tel. 0975 74587
Fax 0975 74760

Servizio di farmacovigilanza Centro Studi Interazioni dei farmaci.

Diagnosi: cardiomiopatia dilatativa, insufficienza renale lieve, verosimile intossicazione digitalica.

Terapia di dimissione ospedaliera:

- Lasix 25 3 cp ore 10
- Enapren 20 ½ cp ore 8 – ore 20
- Monoket 20 1cp ore 18 – ore 22
- Antra 1 cp ore 9
- Montelukast 1 cp ore 19

Osservazioni del paziente: il paziente ci chiede di controllare eventuali interazioni in terapia.

Studio di interazioni.

Analisi dei singoli p.a.

Lasix

- L'assunzione del farmaco è controindicata negli stati di iperdosaggio digitalico (Lanoxin terapia sospesa), negli stati di ipokalemia, iponatriemia finché tali parametri non siano riequilibrati. La deplezione di potassio indotta dal diuretico influenza la sensibilità del miocardio all'azione della digitale (Lanoxin terapia sospesa) ancora in circolo.¹
- L'impiego del diuretico può generare uno stato di ipokalemia. Monitorare il potassio ematico ed eventualmente si consiglia una dieta ricca di potassio: verdure fresche (asparagi, carote crude, patate, pomodoro crudo, spinaci cotti), frutta fresca (avocado, albicocche secche, arancia, banane, fragole, mela, melone, pesca, prugne), carne (agnello, maiale, pollo e carni bianche), pesce (merluzzo, salmone, tonno sott'olio).⁸

- In casi rari è stata riscontrata una riduzione della concentrazione sierica di calcio.¹
- Nei pazienti in trattamento con enalapril (Enapren in terapia) dovrebbe essere attentamente monitorato lo stato di idratazione ed il peso corporeo: l'effetto del diuretico (Lasix in terapia) può essere diminuito.⁷

Enapren

- E' stata riscontrata ipotensione in pazienti con ipertensione come possibile conseguenza dell'impiego del farmaco in soggetti trattati con diuretici (Lasix in terapia). Monitorare la pressione arteriosa all'inizio del trattamento e ad ogni aumento di dosaggio di enalapril (Enapren in terapia) e diuretico (Lasix in terapia), specialmente in pazienti con cardiomiopatia ischemica. Se si ha ipotensione, il paziente deve essere posto in posizione supina e se necessario essere sottoposto ad infusione endovenosa di soluzione fisiologica. Una transitoria risposta ipotensiva non è una controindicazione ad ulteriori dosi, che di solito possono essere somministrate senza difficoltà una volta che la pressione arteriosa è aumentata.¹⁻²
- Non sottovalutare la comparsa di vomito, diarrea o eccessiva traspirazione.¹
- Nei pazienti in trattamento con enalapril (Enapren in terapia) dovrebbe essere attentamente monitorato lo stato di idratazione ed il peso corporeo: l'effetto del diuretico (Lasix in terapia) può essere diminuito.⁷

Monoket

- Il trattamento è controindicato in caso di grave ipotensione arteriosa.¹

Le nostre osservazioni

- Monitorare regolarmente la pressione arteriosa.
- Effettuare regolari controlli degli elettroliti plasmatici.
- Valutare lo stato di idratazione ed il peso corporeo.

Si mette a disposizione del medico curante la bibliografia consultata per lo studio condotto.

Padula Scalo, 27/01/03

Bibliografia:

- ¹REFI 2002
- ²S. Garattini “*Interazioni tra i farmaci*” Selecta medica
- ³Martindale 2002
- ⁴THE MEDICAL LETTER “*Manuale delle interazioni tra farmaci*” CIS editore
- ⁵Goodman & Gilman “*Le basi farmacologiche della terapia*” Ed.Zanichelli
- ⁶Guida all’uso dei farmaci. Ministero della salute
- ⁷David S. Tatro “Drug Interaction Facts” Malesci
- ⁸M.T. Murray “Il potere curativo dei cibi” Red edizioni
- ⁹www.farmacovigilanza.org