

Farmacia Dr. Di Muria Alberto

Via Nazionale 199

Padula Scalo (SA)

Tel. 0975 74587

Fax 0975 74760

Servizio di farmacovigilanza Centro Studi Interazioni dei farmaci.

Diagnosi: angina ed ischemia ecografia di ponte miocardio determinante stenosi di grado moderato di IVA media. Cardiopatia ipertensiva. Gastropatia erosiva antrale ed ulcera della parete posteriore dell'antro gastrico. Anemia sideropenica secondaria.

Terapia di dimissione ospedaliera:

- Nexium 40
- Carvipres 25
- Dermatrans 5
- Lortaan

Osservazioni del paziente: il paziente ci chiede di controllare eventuali interazioni in terapia.

Studio di interazioni.

Analisi dei singoli p.a.

Nexium

- Il farmaco inibisce il metabolismo epatico del losartan (Lortaan in terapia): risulta aumentata la concentrazione ematica in circolo e potrebbe rendersi necessario un adeguamento del dosaggio.³

Carvipress

- Potenzia l'azione antiipertensiva di losartan (Lortaan in terapia): monitorare la pressione arteriosa.¹⁻³

Lortaan

- Monitorare azotemia e creatinina per valutare un'eventuale compromissione renale indotta dal farmaco. Eventualmente ridurre il dosaggio, alla luce della possibile interazione metabolica con esomeprazolo (Nexium in terapia)¹⁻³
- Potenzia l'azione antiipertensiva di carvedilolo (Carvipress in terapia): monitorare la pressione arteriosa.¹⁻³

Le nostre osservazioni

- Monitorare la pressione arteriosa.
- Si consiglia una determinazione dell'azotemia e creatinina

Si mette a disposizione del medico curante la bibliografia consultata per lo studio condotto.

Padula Scalo, gg/m/aa

Bibliografia:

- ¹REFI
- ²S. Garattini *“Interazioni tra i farmaci”*Selecta medica
- ³Martindale 2002
- ⁴THE MEDICAL LETTER *“Manuale delle interazioni tra farmaci”* CIS editore
- ⁵Goodman & Gilman *“Le basi farmacologiche della terapia”* Ed.Zanichelli
- ⁶Guida all'uso dei farmaci. Ministero della salute