

Farmacia Dr. Di Muria Alberto

Via Nazionale 199

Padula Scalo (SA)

Tel. 0975 74587

Fax 0975 74760

www.farmaciadimuria.it

info@farmaciadimuria.it

Servizio di farmacovigilanza Centro Studi Interazioni dei farmaci.

Terapia:

- Eutirox 50 1cp al mattino
- Prazene 1cp ore 8
- Elopram ½ cp ore 14
- Acediur ½ cp ore 21
- En 4gtt ore 22
- Trittico 4gtt ore 22
- Laroxyl 4gtt ore 22
- Entumin 1gtt ore 22

Osservazioni del paziente: il paziente ci chiede di controllare eventuali interazioni in terapia ed eventuali effetti collaterali responsabili dei valori soglia di CPK e colesterolo.

Studio di interazioni.

Analisi dei singoli p.a.

Eutirox (lexotiroxina)

- Poiché in soggetti trattati con preparati tiroidei sono stati riportati rari casi di disfunzione epatica, si raccomanda di ridurre il dosaggio o di sospendere il trattamento qualora, nel corso della terapia, comparissero febbre, debolezza muscolare (*sintomatologia riportata dalla paziente*) o anomalie dei test di laboratorio per la funzionalità epatica (*come nel caso in questione*).¹
- Occasionalmente, specie all'inizio della terapia, o in caso di iperdosaggio, possono manifestarsi crampi della muscolatura scheletrica (*sintomatologia*

riportata dalla paziente). In questi casi è consigliabile, su indicazione medica, la riduzione della posologia quotidiana o la sospensione del trattamento per alcuni giorni.¹

Prazene (prazepam)

- In caso di trattamento prolungato, è consigliabile praticare periodicamente controlli del quadro ematico e della funzionalità epatica.¹
- Associazione con i deprimenti del SNC: l'effetto depressivo centrale può essere accresciuto nei casi di uso concomitante con antipsicotici (Entumin in terapia), ipnotici, ansiolitici/sedativi (En in terapia), antidepressivi (Elopram, Trittico, Laroxyl in terapia), analgesici narcotici, antiepilettici, anestetici e antistaminici sedativi.¹
- Effetti indesiderati segnalati sono: sonnolenza, ottundimento delle emozioni, riduzione della vigilanza, confusione, affaticamento, cefalea, vertigini, debolezza muscolare, atassia, visione doppia.¹

Elopram (citalopram)

- In caso di somministrazione con trazodone (Trittico in terapia) possono risultare aumentati i livelli plasmatici di quest'ultimo con conseguente aumento degli effetti collaterali e tossici.⁷

Acediur (captopril + idroclortiazide)

- Sono noti i seguenti effetti collaterali: debolezza, ipopotassiemia, ipercalcemia, spasmi muscolari.¹
- Nel corso di trattamento è stata raramente descritta una sindrome itterica.¹

En (clordemetildiazepam)

- Associazioni con i deprimenti del SNC: l'effetto depressivo centrale può essere accresciuto nei casi di uso concomitante con antipsicotici (Entumin in terapia), ipnotici, ansiolitici/sedativi (Prazene in terapia), antidepressivi (Laroxyl, Trittico, Elopram), analgesici narcotici, antiepilettici, anestetici e antistaminici sedativi. Nel caso degli analgesici narcotici può avvenire aumento dell'euforia conducendo ad un aumento della dipendenza psichica.¹
- Deficit psicomotorio con riduzione del tempo di reazione e dello stato di vigilanza in associazione con amitriptilina (Laroxyl in terapia)²

Trittico (trazodone)

- Sempre raramente, sono state riportate alterazioni della funzione epatica, talora severe, incluso ittero e danno epatocellulare. Nei casi suddetti il trattamento con trazodone deve essere interrotto immediatamente.¹

Laroxyl (amitriptilina cloridrato)

- Poiché il farmaco può causare ipotensione ortostatica, variazioni della glicemia, turbe dell'emopoiesi, del fegato e del rene, è raccomandabile eseguire periodici controlli della pressione arteriosa, della glicemia, della crasi ematica e della funzionalità epatica e renale con speciale riguardo agli ipertesi, ai diabetici, ai nefropatici e nei soggetti con affezioni, in atto o pregresse, dell'apparato emopoietico.¹
- Sostanze ad azione depressiva sul S.N.C.: gli antidepressivi triciclici possono accentuare l'azione di farmaci come gli ipnotici, sedativi, ansiolitici (En, Prazene in terapia) ed anestetici.¹
- Deficit psicomotorio con riduzione del tempo di reazione e dello stato di vigilanza in associazione con benzodiazepine (En, Prazene in terapia)²

Entumin (clotiapina)

- Il farmaco può potenziare l'azione di farmaci sedativi.¹
- Il farmaco può potenziare l'azione ipotensiva di farmaci antiipertensivi (Acediur in terapia).¹

Le nostre osservazioni

- Si consiglia di monitorare la funzionalità epatica alla luce dei possibili effetti sull'organo di alcuni farmaci in terapia.
- Ripetere esami ematici per valutare eventuali alterazioni della VES.
- Molti farmaci in terapia presentano come effetto collaterale debolezza muscolare, affaticamento, crampi come riportato dalla paziente.

Si mette a disposizione del medico curante la bibliografia consultata per lo studio condotto.

Padula Scalo, 04/07/03