

## ALCUNI FARMACI NON DOVREBBERO ESSERE GENERALMENTE PRESCRITTI NELL'ANZIANO

FARMACI	INCONVENIENTI	ALTERNATIVE
<b>ANLGESICI</b> Ketorolac Meperidina Propoxifene	Grave tossicità gastrointestinale Confusione mentale, convulsioni Convulsioni, limitata efficacia	E' preferibile la morfina
<b>ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI</b> Amitriptilina Doxepina	Effetti anticolinergici (stipsi, ritenzione urinaria, offuscamento visivo, confusione mentale), ipotensione ortostatica, sedazione e aritmie cardiache	Sono preferibili gli inibitori della ricaptazione della serotonina ad eccezione della fluoxetina.
<b>ANTISTAMINICI</b> Clorfenamina Difenidramina Idroxizina Prometazina	Stipsi, ritenzione urinaria, offuscamento visivo, confusione mentale. Alcuni antistaminici, quali la difenidramina e la prometazina sono altamente sedative.	Sono preferibili gli antistaminici più recenti come la fexofenadina o la loratadina.
<b>ANTISPASTICI</b> Alcaloidi della belladonna Iosciamina	Stipsi, ritenzione urinaria, offuscamento visivo, confusione mentale	
<b>SEDATIVI</b> Barbiturici Clordiazepossido, Diazepam, Flurazepam Meprobamato	Sedazione, dipendenza Sedazione prolungata Sedazione, dipendenza	Sono preferibili basse dosi di lorazepam

Fonte: The Medical Letter 15/02/2006