

Se sei in terapia con...	... attenzione alla comparsa di	... quindi occorre:
Aggiunta di amiodarone (Amiodar) ad un paziente già in terapia con digossina (Lanoxin, Lanitop) e senza successivo monitoraggio dei livelli plasmatici.	Anoressia o nausea e vomito o diarrea o disturbi della vista o affaticamento o sonnolenza o confusione o aritmia o delirio o allucinazioni.	?
Farmaci ipocolesterolemizzanti come simvastatina (Liponorm, Medipo, Sinvacor, Sivastin), atorvastatina (Lipitor, Totalip, Xarator), pravastatina (Prasterol, Selectin).	Aumento delle transaminasi oltre 3 volte i limiti della norma o ittero.	?
Un farmaco antinfiammatorio per uso orale (Moment, Momendol, Aulin, Brufen...) o per uso topico (Momendol Gel, Voltaren ...)	Difficoltà digestive, sanguinamento gastrointestinale, perforazione, ulcera, anemia	?
Un farmaco antiipertensivo come ramipril (Quark, Triatec), enalapril (Converten, Enapren, Naprilene)...	Iperkaliemia (livello di potassio > 5.5mmol/L) Creatininemia aumentata (>150microml/L) Stipsi cronica	?
Un farmaco analgesico come tramadolo (Contramal, Fortradol, Fraxidol), fentanil (Durogesic), morfina (MS-Contin, Oramorph), buprenorfina (Temgesic)...		?
Digossina (Lanoxin, Lanitop) usata cronicamente con una dose precedentemente stabilita.	Sonnolenza o confusione o aritmia o delirio o allucinazione.	?
Un farmaco antiipertensivo come ramipril (Quark, Triatec), enalapril (Converten, Enapren, Naprilene) e un diuretico come spironolattone (Aldactone, Spirolang), potassio kanreonato (Kanrenol).	Iperkaliemia (livello di potassio > 5.5mmol/L)	?
La metoclopramide (Plasil) in paziente in terapia con antiparkinson	Peggioramento dei sintomi del morbo di Parkinson	?
Un cortisonico inalatorio fluticasone (Flixotide, Fluspiral), mometasone (Nasonex, Uniclar).	Mughetto e disfonia.	?
Un collirio betabloccante timololo (Droptimol, Timolabak) e sei un paziente asmatico. Un farmaco antinfiammatorio in caso di prima assunzione.	Peggioramento dei sintomi asmatici	?
Un cortisonico come prednisolone alla dose < di 7.5mg al giorno per un lungo periodo.	Osteoporosi e fratture ossee	?
Fenitoina (Aurantin, Dintoina) con una dose precedentemente stabilita e per un uso continuativo.	Ricovero ospedaliero a causa di perdita di controllo e convulsioni	?

Farmacia Dr. Di Muria Alberto
Via Nazionale 199 Padula Scalo SA
Tel 0975/74587
info@farmaciadimuria.it